

Инструкция по применению препарата ветеринарного «Мазь ихтиоловая 10 % БТ»

1 Общие сведения

- 1.1 **Мазь ихтиоловая 10 % БТ** (Unguentum Ichthyoli 10% BT).
- 1.2 Препарат представляет собой мазь от светло-коричневого до черного цвета.
- 1.3 В 1 г препарата содержится 0,1 г ихтиола, вспомогательные вещества и основа.
- 1.4 Препарат упаковывают в полимерные банки массой нетто 50, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 и 2000 г.
- 1.5 Препарат хранят в упаковке предприятия-изготовителя по списку Б, в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.
- 1.6 Срок годности два года от даты изготовления, при соблюдении условий хранения.

2 Фармакологические свойства

- 2.1 Препарат оказывает выраженное местное противовоспалительное и антисептическое действие, обладает противозудным и кератостатическим эффектом.
- 2.2 Препарат действует местно, регулирует сосудистый тонус, восстанавливает кровообращение, улучшает обмен веществ, что уменьшает секрецию и экссудацию, способствует рассасыванию воспалительных очагов, снижает болезненность, устраняет кожный зуд и процессы избыточного ороговения кожи. При нанесении на раны ускоряет регенерацию поврежденной ткани.

3 Порядок применения препарата

- 3.1 Препарат предназначен для лечения животных при воспалительно-экссудативных процессах. Назначают при различных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (ранах, пододерматитах, экземах, ожогах, дерматитах, абсцессах, фурункулезе, пиодермии), маститах, миозитах, невритах, невралгиях, артритах, тендинитах, тендовагинитах, бурситах.
- 3.2 Препарат применяют наружно, нанося тонким равномерным слоем на пораженные участки кожи 1-2 раза в сутки до полного выздоровления, или пропитывают марлевую салфетку и накладывают её на поврежденную поверхность под повязку, которую меняют через 24 - 48 часов.
- 3.3 В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений и осложнений.
- 3.4 Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животных к компонентам. Препарат фармацевтически несовместим с йодидами, алкалоидами, солями тяжелых металлов.
- 3.5 У животных с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции (дерматит, зуд, отек). При их возникновении применение препарата необходимо отменить и назначить десенсибилизирующую терапию (димедрол, раствор кальция хлорида).

3.6 Продукцию, полученную от животных, обработанных препаратом, используют без ограничений.

4 Меры личной профилактики

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности.

5 Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения соответствия нормативным документам.

6 Полное наименование производителя

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «Белэкотехника», пер. Промышленный, 9, 222823, г.п. Свислочь, Пуховичский р-н, Минская обл., Республика Беларусь.

Инструкция по применению препарата разработана доцентом кафедры фармакологии и токсикологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» Петровым В.В., начальником отдела развития ООО «Белэкотехника» Пиотухом А.С.

