

Инструкция по применению препарата ветеринарного «Тимпанол М»

1 Общие сведения

1.1 **Тимпанол М** (Tympanolum M).

1.2 Препарат представляет собой жидкость от коричневого до черного цвета. Допускается выпадение незначительного осадка.

1.3 Препарат содержит 5% молочной кислоты, 1 % муравьиной кислоты, вспомогательные вещества и растворитель.

1.4 Препарат упаковывают в стеклянные флаконы номинальным объемом 100; 200; 250; 400; 450 и 500,0 см³, или полимерную упаковку по 0,5 и 1 дм³.

1.5 Препарат хранят в упаковке предприятия-изготовителя по списку Б, в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

1.6 Срок годности - два года от даты изготовления при соблюдении условий хранения.

2 Фармакологические свойства

2.1 Препарат оказывает руминаторное, противобродильное и антисептическое действие.

Препарат при введении внутрь жвачным животным, препятствует газообразованию, разрушает образовавшиеся в кормовых массах пузырьки газа и обеспечивает быстрое удаление их во внешнюю среду.

2.2 Входящие в состав препарата органические кислоты, молочная и муравьиная, подавляют рост и развитие патогенной, гнилостной микрофлоры желудочно-кишечного тракта, чем обусловлено снижение образования токсичных продуктов распада органических веществ в организме.

Компоненты препарата возбуждают деятельность пищеварительных желез, усиливают секрецию и перистальтику пищеварительного тракта, расслабляют тонус сфинктеров преджелудков, что обеспечивает быстрое продвижение содержимого в кишечнике.

2.3 После всасывания из желудочно-кишечного тракта компоненты препарата используются организмом для синтеза глюкозы и гликогена.

3 Порядок применения препарата

3.1 Препарат предназначен для лечения крупного рогатого скота, овец и коз при гипо- и атонии рубца, острой и периодической тимпании.

3.2 Препарат задают внутрь при помощи резиновой бутылки или пищеводного зонда непосредственно в полость рубца, в следующих дозах:

- **крупному рогатому скоту** – 100-120 см³ на 100 кг массы животного;
- **мелкому рогатому скоту** (овцам, козам), **телятам** – 50-60 см³ на животное с водой в соотношении 1:1-1:2.

В случае необходимости (острое течение тимпани, нарушение акта глотания) препарат можно вводить в полость рубца с помощью троакара через брюшную стенку в области левой голодной ямки. Если состояние животного через 20-30 мин после введения препарата не улучшилось, препарат применяют повторно.

3.3 При применении препарата допускается использовать другие лекарственные средства (настойку чемерицы, ихтиол).

3.4 В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений.

3.5 Продукцию, полученную от животных, обработанных препаратом, используют без ограничений.

4 Меры личной профилактики

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности.

5 Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения соответствия нормативным документам.

6 Полное наименование производителя

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «Белэкотехника», пер. Промышленный, 9, 222823, г.п. Свислочь, Пуховичский р-н, Минская обл., Республика Беларусь.

Инструкция по применению препарата разработана доцентом кафедры фармакологии и токсикологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» Петровым В.В., начальником отдела развития ООО «Белэкотехника» Пиотухом А.С.

